

PROVTAGNINGSPREKOMMENDATION FÖR COVID-19

Versionshistorik

Version	Ändringar
Aktuell version	Rensning av text. Ingen förändring av rekommendationer.

VID SYMPTOM PÅ COVID-19

Provtagning rekommenderas vid symptom på covid-19 enligt följande:

- Personer vars läkare bedömer att en covid-19-diagnos har betydelse för personens fortsatta behandling, medicinsk indikation.
- Patienter inom hälso- och sjukvård där läkare bedömer att en covid-19 diagnos har betydelse för åtgärder som vidtas inom sjukvården, till exempel smittförebyggande åtgärder.
- I omsorgsverksamheter för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 (ex. SÄBO för äldre, hemtjänst, dagverksamheter, verksamheter inom LSS).
- Frikostig provtagning rekommenderas i slutenvård.

PROVTAGNING AV ASYMPTOMATISKA – SCREENING

Verksamheter kan besluta om provtagning till exempel inför inläggning i särskilt känsliga miljöer vid hög förekomst av covid-19 i samhället.

PROVTAGNING VID SMITTSPÅRNING I VÅRD OCH OMSORG

Smittspårning och screening kan bli aktuellt vid fler misstänka och/eller bekräftade fall på en enhet. Det kan även vara av vikt att screena asymtomatiska personer. Rådgör alltid med Vårdhygien.

REMISSINFORMATION OCH PROVTAGNINGSANVISNING

Viktig remissinformation: Symtom, provtagning vid inläggning på sjukhus/boende, Boende på SÄBO/korttidsboende/gruppboende, vård- eller omsorgspersonal, misstanke om smitta utomlands.

Hantering av proverna på laboratorierna Analysen utförs under respektive laboratoriums ordinarie öppettider och svar erhålles inom 1 dygn. Proverna analyseras med PCR teknik på alla Regionens sjukhus.